



Пивной алкоголизм - коварная болезнь. Любители пива постепенно приучаются не только к опьяняющему действию алкоголя, но и к успокаивающему нервы седативному свойству напитка. Приятное расслабление хочется повторять снова и снова, поэтому дозы приходится увеличивать. Употребление пива вызывает болезненное влечение, подобное зависимости от настоящего наркотика.



Когда следует бить тревогу и прекратить пить пиво:

- Если человек выпивает больше одного литра пива в день.
- Часто собирается с друзьями, чтобы расслабиться в компании янтарного напитка.
- Раздражается и злится, если не выпьет.
- Жалуется на здоровье.
- Становится обладателем «пивного животика».
- Имеет проблемы с потенцией.
- Не может расслабиться, уснуть без допинга-пива.
- Просит с утра опохмелиться.

Запомни!

Выбор есть всегда!

ГУЗ РХ «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ»

ул. Крылова, 47 «а», г. Абакан,

Республика Хакасия, 655017

Тел.: (3902) 34-82-79

Узнай больше на сайте

www.zdorovyie.khakassia.ru

Одобрено главным внештатным
наркологом РХ О.В. Кокориной

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ГУЗ РХ «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ»



**О ПИВНОМ
алкоголизме...**